

**Analysis II****Arbeitsblatt 55****Übungsaufgaben**

AUFGABE 55.1. Formuliere und beweise den „Satz über die surjektive Abbildung“.

AUFGABE 55.2. Sei  $(M, d)$  ein metrischer Raum und sei  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  eine Folge in  $M$ , die gegen  $x \in M$  konvergiert. Es sei  $T$  eine Menge und es seien

$$f_n: T \longrightarrow M, t \longmapsto f_n(t) = x_n,$$

die zu  $x_n$  gehörenden konstanten Funktionen. Zeige, dass die Funktionenfolge  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  gleichmäßig gegen die konstante Funktion

$$f: T \longrightarrow M, t \longmapsto f(t) = x,$$

konvergiert.

AUFGABE 55.3. Es sei  $T$  eine endliche Menge und

$$f_n: T \longrightarrow X$$

eine Funktionenfolge in einen metrischen Raum  $X$ . Zeige, dass diese Folge genau dann punktweise konvergiert, wenn sie gleichmäßig konvergiert.

AUFGABE 55.4. Sei  $(Y, d)$  ein metrischer Raum und  $T \subseteq Y$  eine Teilmenge. Es sei  $T \subseteq \tilde{T} \subseteq \bar{T}$  und

$$g_n: \tilde{T} \longrightarrow \mathbb{K}$$

eine Folge von stetigen Funktionen. Zeige, dass diese Folge genau dann gleichmäßig konvergiert, wenn die auf  $T$  eingeschränkte Folge  $f_n = g_n|_T$  gleichmäßig konvergiert.

AUFGABE 55.5. Sei  $T$  eine Menge und  $E$  ein euklidischer Vektorraum. Es sei  $M = \text{Abb}(T, E)$  versehen mit der Supremumsnorm. Beweise die folgenden Eigenschaften für diese „Norm“ (dabei ist der Wert  $\infty$  erlaubt und sinnvoll zu interpretieren).

- (1)  $\|f\| \geq 0$  für alle  $f \in M$ .
- (2)  $\|f\| = 0$  genau dann, wenn  $f = 0$  ist.

(3) Für  $\lambda \in \mathbb{R}$  und  $f \in M$  gilt

$$\|\lambda f\| = |\lambda| \cdot \|f\| .$$

(4) Für  $g, f \in M$  gilt

$$\|g + f\| \leq \|g\| + \|f\| .$$

AUFGABE 55.6. Es sei

$$C = C^0([0, 1], \mathbb{R})$$

die Menge der stetigen Funktionen, die mit der Supremumsnorm versehen sei. Skizziere zu  $\epsilon > 0$  die offene und die abgeschlossene  $\epsilon$ -Umgebung von einem  $f \in C$ .

Es sei  $V$  ein  $\mathbb{K}$ -Vektorraum. Eine Abbildung

$$\|-\|: V \longrightarrow \mathbb{R}, v \longmapsto \|v\|,$$

heißt *Norm*, wenn die folgenden Eigenschaften für alle  $v, w \in V$  gelten.

- (1)  $\|v\| \geq 0$ ,
- (2)  $\|v\| = 0$  genau dann, wenn  $v = 0$  ist.
- (3) Für  $\lambda \in \mathbb{K}$  und  $v \in V$  gilt

$$\|\lambda v\| = |\lambda| \cdot \|v\| .$$

(4) Für  $v, w \in V$  gilt

$$\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\| .$$

Die Norm zu einem Skalarprodukt erfüllt diese Eigenschaften.

AUFGABE 55.7. Es sei  $T$  eine Menge und  $E$  ein euklidischer Vektorraum. Es sei

$$M = \{f : T \rightarrow E \mid \|f\|_T < \infty\}$$

die Menge der beschränkten Abbildungen von  $T$  nach  $E$ . Zeige, dass die Supremumsnorm auf  $M$  eine Norm ist.

AUFGABE 55.8. Zeige, dass ein normierter  $\mathbb{R}$ -Vektorraum durch

$$d(u, v) := \|u - v\|$$

zu einem metrischen Raum wird.

AUFGABE 55.9. Es sei  $T$  eine Menge,  $E$  ein euklidischer Vektorraum und

$$M = \{f : T \rightarrow E \mid \|f\|_T < \infty\}$$

die Menge der beschränkten Abbildungen von  $T$  nach  $E$ . Zeige, dass eine Folge  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  aus  $M$  genau dann gegen  $f \in M$  gleichmäßig konvergiert, wenn diese Folge im durch die Supremumsnorm gegebenen metrischen Raum  $M$  konvergiert.

### Aufgaben zum Abgeben

AUFGABE 55.10. (5 Punkte)

Es sei

$$\gamma: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

eine reguläre Kurve. Zeige, dass die Faser über jedem Punkt  $c \in \mathbb{R}^n$  endlich ist.

AUFGABE 55.11. (4 Punkte)

Sei  $T \subseteq \mathbb{R}^n$  eine kompakte Teilmenge und  $E$  ein euklidischer Vektorraum. Es sei  $C = C^0(T, E)$  der Raum der stetigen Abbildungen von  $T$  nach  $E$ , versehen mit der Supremumsnorm. Es seien  $x_1, \dots, x_n \in T$  und  $y_1, \dots, y_n \in E$  Punkte. Zeige, dass die Teilmenge

$$\{f \in C \mid f(x_1) = y_1, \dots, f(x_n) = y_n\}$$

abgeschlossen in  $C$  ist.

AUFGABE 55.12. (4 Punkte)

Es sei  $M_k = ((a_{ij})_k)_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}$  eine Folge von reellen  $m \times n$ -Matrizen und

$$\varphi_k: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$$

die zugehörige Folge von linearen Abbildungen. Zeige, dass die Folgen der Einträge  $(a_{ij})_k$  für alle  $i, j$  genau dann konvergieren, wenn die Folge der Abbildungen punktweise konvergiert.